

DM n<sup>o</sup>4

## Indications sur la notation :

- exercice 1 : 32
- exercice 2 : 18
- exercice 3 : 24
- exercice 4 : 32

Total pour avoir 20/20 : 80

**IMPORTANT** : on prêtera une attention toute particulière au sens de ce qu'on écrit. Les erreurs suivantes seront particulièrement sanctionnées, en étant comptabilisées et entraînant un malus global à la copie :

1. une primitive est une fonction : on ne doit pas écrire “ $x\ln(x) - x$  est une primitive de  $\ln(x)$ ” mais bien “ $x \mapsto x\ln(x) - x$  est une primitive de  $\ln$ ”
2. une primitive n'est pas unique : on n'écrira jamais “la primitive”. Ou bien on définit sa valeur  $y_0$  en un  $x_0$  et on dira “l'unique primitive qui vaut  $y_0$  en  $x_0$ ” ou bien on écrira plus simple “une primitive” ;
3. une solution d'une équation différentielle est une fonction : pour donner les solutions d'une équation différentielle, on écrira soit “les solutions sont les fonctions de la forme  $x \mapsto \lambda \dots$  pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ ” ou alors “l'ensemble solution de l'équation est :  $S = \{x \mapsto \lambda \dots \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ ”
4. si on considère une équation différentielle linéaire, on peut être amené à résoudre l'équation homogène associée : on n'écrira pas “les solutions homogènes sont...” mais bien “les solutions de l'équation homogène sont...”
5. un polynôme possède des racines tandis qu'une équation polynomiale possède des solutions : on ne parle pas de solution d'un polynôme, ni de racine d'une équation ;
6. quand on écrit une intégrale, la variable d'intégration ne doit pas apparaître dans les bornes ;
7. la conjugaison du verbe résoudre doit être maîtrisée.

## I Intégrales et primitives

**Exercice 1** Déterminer primitives des fonctions suivantes, en précisant bien à chaque fois l'intervalle sur lequel cette primitive est valable :

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $t \mapsto \sin^3(t)$        | 6. $t \mapsto \ln(1 + t^2)$           |
| 2. $t \mapsto \sin(2t)e^{-t}$   | 7. $t \mapsto \text{Arctan}(t)$       |
| 3. $t \mapsto (t^2 + t + 1)e^t$ | 8. $t \mapsto \frac{1}{t^2 - 3t + 2}$ |
| 4. $t \mapsto t\cos(t)$         | 9. $t \mapsto \frac{1}{t^2 + 2t + 5}$ |
| 5. $t \mapsto t^2\ln(t)$        |                                       |

**Exercice 2**

Appliquer le changement de variable demandé, et en déduire des primitives des fonctions suivantes :

1.  $t \mapsto \frac{1}{t\sqrt{t^2 - 1}}$  avec  $u = \sqrt{t^2 - 1}$

2.  $t \mapsto \frac{1}{t + t(\ln(t))^2}$  avec  $u = \ln(t)$

3.  $t \mapsto \frac{1}{e^t + 1}$  avec  $u = e^t$

4.  $t \mapsto \frac{1}{t^2\sqrt{1+t^2}}$  avec  $t = \frac{1}{u}$

5.  $t \mapsto \frac{1}{t\sqrt{\ln(t) + 1}}$  avec  $t = e^u$

6.  $t \mapsto \sin^5(t)$  avec  $u = \cos(t)$

## II Équations différentielles

### Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes, puis résoudre le problème de Cauchy associé :

1.  $y' + y = 2\sin(x)$ , avec  $y(0) = 36$ .

2.  $(x^2 + 1)y' - xy = (x^2 + 1)^{3/2}$ , avec  $y(1) = \sqrt{2}$

3.  $(1 + \cos^2(x))y' - \sin(2x)y = x\cos(x)$ , avec  $y(\pi) = 18$

4.  $(1 + e^x)y' + e^x y = 1 + xe^x$ , avec  $y(1) = 1$

### Exercice 4

Résoudre les équations différentielles suivantes, puis résoudre le problème de Cauchy associé.

On n'exprimera que les solutions réelles, et on veillera à ne pas utiliser l'exponentielle complexe pour les exprimer (on utilisera les fonctions circulaires à la place).

1.  $y'' + y' - 2y = 12\operatorname{sh}(x)$ ,  $y(0) = -1$  et  $y'(0) = 16$

2.  $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$ ,  $y(0) = 3$  et  $y'(0) = -4$

3.  $y'' - 2y' - 2y = 18xe^x$ ,  $y(0) = 2$  et  $y'(0) = -3$

*Indication :* on pourra chercher une solution particulière sous la forme  $x \mapsto f(x)xe^x$  où  $f$  est une fonction affine

4.  $y'' + 2y' + 2y = 5\sin(x)$ ,  $y(0) = 35$  et  $y'(0) = 3$