

**DS n<sup>o</sup>5****I Exercices**

**Exercice 1** Donner un équivalente et la limite des suites suivantes :

1.  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$  : on se ramène en 1 en divisant par  $n$  dans les racines :

$$\sqrt{n+1} = \sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = \sqrt{n} \left( 1 + \frac{1}{2n} + o(1/n) \right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2\sqrt{n}} + o(1/\sqrt{n})$$

et de même :

$$\sqrt{n-1} = \sqrt{n} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} = \sqrt{n} \left( 1 - \frac{1}{2n} + o(1/n) \right) = \sqrt{n} - \frac{1}{2\sqrt{n}} + o(1/\sqrt{n})$$

et par somme :

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \sqrt{n} + \frac{1}{2\sqrt{n}} - \sqrt{n} + \frac{1}{2\sqrt{n}} + o(1/\sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{n}} + o(1/\sqrt{n}) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

et par quotient :  $\lim \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = 0$ .

2.  $(n^2+1)\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$  : en reconnaissant un polynôme :  $n^2+1 \sim n^2$  et par composition  $\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ .  
Par produit, il vient :

$$(n^2 + 1)\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{n^2}{\sqrt{n}} \sim n^{3/2}$$

et directement :  $\lim(n^2 + 1)\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = +\infty$

3.  $\frac{n^2 + 5n - 2}{3n^3 + 2n - 3}$  pour  $n \rightarrow +\infty$  : on un quotient de polynômes, dont on détermine directement un équivalent du numérateur et du dénominateur :

$$\frac{n^2 + 5n - 2}{3n^3 + 2n - 3} \sim \frac{n^2}{3n^3} \sim \frac{1}{3n}$$

et ainsi :  $\lim \frac{n^2 + 5n - 2}{3n^3 + 2n - 3} = 0$

4.  $\frac{e^{1/n} - 1}{\ln(1 + e^{-n})}$  : on utilise les équivalents en 0 de  $e^u - 1$  et  $\ln(1 + u)$ , qui donnent ici :

$$\frac{e^{1/n} - 1}{\ln(1 + e^{-n})} \sim \frac{\frac{1}{n}}{e^{-n}} \sim \frac{e^n}{n}$$

et donc par croissances comparées :  $\lim \frac{e^{1/n} - 1}{\ln(1 + e^{-n})} = +\infty$ .

**Exercice 2** La fonction  $f$  est définie sur  $E = \mathbb{R} \setminus \{3/2\}$  (on souhaite que le dénominateur ne s'annule pas).

Soit  $y \in \mathbb{R}$ . Résolvons sur  $E$  :

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{x-5}{2x-3} = y \\ &\Leftrightarrow x-5 = y(2x-3) \text{ car } 2x-3 \neq 0 \\ &\Leftrightarrow 3y-5 = x(2y-1) \end{aligned}$$

et on a deux cas :

- si  $y = 1/2$  : l'équation devient  $-7/2 = 0$ , qui n'a pas de solution ; donc  $y = 1/2$  n'a pas d'antécédent par  $F$  ;
- sinon :

$$f(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{3y-5}{2y-1}$$

et donc l'équation  $f(x) = y$  admet une unique solution (à savoir  $\frac{3y-5}{2y-1}$ ), c'est-à-dire que  $y$  possède un unique antécédent.

Ainsi  $E = \mathbb{R} \setminus \{3/2\}$  et  $F = \mathbb{R} \setminus \{1/2\}$  conviennent. Et alors :

$$f^{-1} : \begin{cases} F & \rightarrow E \\ y & \mapsto \frac{3y-5}{2y-1} \end{cases} .$$

**Exercice 3** On procède par double implication :

- si  $B = C$  : alors directement  $A \cap B = A \cap C$  et  $A \cup B = A \cup C$  ;
- si  $A \cap B = A \cap C$  et  $A \cup B = A \cup C$  : du fait des rôles symétriques de  $B$  et  $C$ , il suffit de montrer que  $B \subset C$  pour avoir  $C \subset B$ , et donc  $B = C$ .

Montrons donc que  $B \subset C$ .

Soit  $x \in B$ . Alors :

- si  $x \in A$  : alors  $x \in B$  et  $x \in A$ .  
Donc  $x \in A \cap B = A \cap C$ .  
Donc  $x \in A$  et  $x \in C$ .  
Donc  $x \in C$ .
- sinon : alors  $x \notin A$ .  
Mais  $x \in B$  donc  $x \in A \cup B = A \cup C$ .  
Donc  $x \in A$  ou  $x \in C$ .  
Mais  $x \notin A$ .  
Donc  $x \in C$ .

Dans les deux cas :  $x \in C$ .

Donc  $B \subset C$ .

D'où l'équivalence.

**Exercice 4** On considère  $E, F, G, H$  quatre ensembles (supposés non vides), et  $f : E \rightarrow F$ ,  $g : F \rightarrow G$  et  $h : G \rightarrow H$  trois applications.

1. On suppose que  $g \circ f$  est injective.

(a) L'application  $f$  est injective. Montrons le.

Soient  $x_1, x_2 \in E$ . Supposons  $f(x_1) = f(x_2)$ .

Alors  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ . Mais par injectivité de  $g \circ f$  :  $x_1 = x_2$ .

Donc  $f$  est injective.

(b) Prenons par exemple :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sqrt{x} \end{cases} \text{ et } g : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto x^2 \end{cases} .$$

Alors  $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}_+}$  est injective, mais pas  $g$  (on a par exemple  $g(1) = 1 = g(-1)$ ).

2. On suppose que  $g \circ f$  est surjective.

(a) L'application  $g$  est surjective. Montrons le.

Soit  $z \in G$ .

Par surjectivité de  $g \circ f$ , il existe  $x \in E$  tel que  $z = g \circ f(x)$ .

Et alors en posant  $y = f(x) \in F$ , on a :  $z = g(y)$ .

Donc  $g$  est surjective.

(b) Reprenons l'exemple précédent :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \sqrt{x} \end{cases} \text{ et } g : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \mapsto x^2 \end{cases} .$$

Alors  $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}_+}$  est surjective, mais pas  $f$  (par exemple  $-1$  n'a pas d'antécédent, comme une racine carrée est toujours positive ou nulle).

3. (a) Soient  $x_1, x_2 \in E$ . Supposons que  $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ .

Par injectivité de  $g$  :  $f(x_1) = f(x_2)$ .

Et par injectivité de  $f$  :  $x_1 = x_2$ .

D'où l'injectivité de  $g \circ f$ .

(b) Soit  $z \in G$ .

Par surjectivité de  $g$  : il existe  $y \in F$  tel que  $z = g(y)$ .

Par surjectivité de  $f$  : il existe  $x \in E$  tel que  $y = f(x)$ .

Un tel  $x$  vérifie donc  $g \circ f(x) = g(y) = z$ .

D'où la surjectivité de  $g \circ f$ .

(c) Les deux points précédents donnent que, si  $f$  et  $g$  sont bijectives, elles sont injectives et surjectives, donc  $g \circ f$  aussi, qui est donc bijective.

4. On procède par double implication :

- si  $f, g, h$  sont bijectives : en tant que composées d'applications bijectives,  $g \circ f$  et  $h \circ g$  sont bijectives ;

- si  $g \circ f$  et  $h \circ g$  sont bijectives :

– par injectivité de  $h \circ g$  :  $g$  est injective ;

– par surjectivité de  $g \circ f$  :  $g$  est surjective.

Donc  $g$  est bijective, tout comme sa bijection réciproque  $g^{-1}$ . Et ainsi :

–  $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$  est la composée d'applications bijectives, donc est bijective ;

–  $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$  est la composée d'applications bijectives, donc est bijective.

Ce qui conclut la réciproque.

D'où l'équivalence demandée.

À l'aide des questions précédentes, montrer que l'on a l'équivalence :

$$(g \circ f \text{ et } h \circ g \text{ sont bijectives}) \Leftrightarrow (f, g, h \text{ sont bijectives}).$$

**Exercice 5** On considère  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  et on pose  $a \notin \mathbb{U}$ . On pose :

$$f : z \mapsto \frac{z+a}{1+\bar{a}z}.$$

1. La fonction  $f$  est définie en tout complexe  $z$  tel que  $1 + \bar{a}z = 0$ , c'est-à-dire sur  $\mathbb{C} \setminus \{-1/\bar{a}\}$ .

Comme  $a \notin \mathbb{U}$ , alors  $|a| = |\bar{a}| \neq 1$ , donc  $\left| \frac{-1}{\bar{a}} \right| \neq 1$ , c'est-à-dire que  $\frac{-1}{\bar{a}} \notin \mathbb{U}$ , donc  $f$  est bien définie sur  $\mathbb{U}$ .

2. (a) Pour  $z \in \mathbb{U}$ , on a :  $|z|^2 = z\bar{z} = 1$ . Et ainsi :  $\frac{1}{z} = \bar{z}$ .

(b) On déduit que :

$$|1 + \bar{a}z| = \left| z \left( \frac{1}{z} + \bar{a} \right) \right| = |z| \cdot |\bar{z} + \bar{a}| = 1 \cdot |z + a| = |z + a|$$

et en réinjectant dans l'expression de  $f(z)$  :  $|f(z)| = 1$ .

Ce qui prouve bien que  $f(z) \in \mathbb{U}$ .

3. (a) On a directement :

$$f(z) = \omega \Leftrightarrow \frac{z+a}{1+\bar{a}z} = \omega \Leftrightarrow z(1 - \bar{a}\omega) = \omega - a \Leftrightarrow z = \frac{\omega - a}{1 - \bar{a}\omega}.$$

où la dernière équivalence vient du fait que  $1 - \bar{a}\omega \neq 0$  comme  $\omega \in \mathbb{U}$  et  $\bar{a} \notin \mathbb{U}$ .

(b) On reconnaît la même expression que  $f(z)$ , en changeant  $a$  en  $-a$  et  $z$  en  $\omega$  (qui vérifient les mêmes conditions qu'en question 1) : les mêmes calculs donnent la même conclusion, à savoir que  $\frac{\omega - a}{1 - \bar{a}\omega} \in \mathbb{U}$ .

4. On a donc montré :

- en question 2 que l'on peut considérer  $f : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}$  ;
- en question 3 que tout  $\omega \in \mathbb{U}$  possède un unique antécédent par  $f$ , et que celui est l'élément  $\frac{\omega - a}{1 - \bar{a}\omega} \in \mathbb{U}$ .

Et ainsi,  $f$  réalise bien une bijection de  $\mathbb{U}$  dans  $\mathbb{U}$ , de réciproque :

$$\begin{cases} \mathbb{U} & \rightarrow \mathbb{U} \\ \omega & \mapsto \frac{\omega - a}{1 - \bar{a}\omega} \end{cases} .$$

**Exercice 6** Soient  $E, F$  deux ensembles non-vides, et  $f : E \rightarrow F$ .

1. Soit  $A \in \mathcal{P}(E)$ .

Soit  $x \in A$ .

Alors  $f(x) \in f(A)$  (par définition).

Donc  $x \in f^{-1}(f(A))$  (par définition).

D'où l'inclusion demandée.

2. Prenons  $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^2 \end{cases}$ . Alors avec  $A = \mathbb{R}_+$  on a :  $f(A) = f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$ , puis  $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$ . Donc  $f^{-1}(f(A)) \not\subset A$  dans ce cas.

3. On procède par double implication :

- si  $f$  est injective :

Soit  $A \in \mathcal{P}(E)$ .

Soit  $x \in f^{-1}(f(A))$ .

Alors  $f(x) \in f(A)$ .

Donc il existe  $x' \in A$  tel que  $f(x) = f(x')$ .

Par injectivité de  $f$ , on a :  $x = x'$ . Donc  $x \in A$ .

Donc  $f^{-1}(f(A)) \subset A$ .

- si pour tout  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,  $f^{-1}(f(A)) \subset A$  :

Soient  $x_1, x_2 \in E$  tels que  $f(x_1) = f(x_2)$ .

Posons  $A = \{x_1\}$ .

Alors  $f(A) = \{f(x_1)\}$ .

Mais  $f(x_2) = f(x_1) \in f(A)$ .

Donc par définition :  $x_2 \in f^{-1}(f(A))$ .

Par l'inclusion supposée :  $x_2 \in A = \{x_1\}$ .

Donc  $x_2 = x_1$ .

D'où l'injectivité de  $f$ .

D'où le résultat par double implication.

## II Problème

### II.1 Analyse asymptotique des solutions d'une équation différentielle à coefficients constants

1. On a une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants, de polynôme caractéristique  $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ . L'ensemble des solutions réelles est donc :

$$\{x \mapsto A\cos(x) + B\sin(x) \mid A, B \in \mathbb{R}\}.$$

2. Procédons par disjonction de cas :

- si  $A \neq 0$  : alors par opérations sur les limites :  $\lim_{x \rightarrow 0} A\cos(x) + B\sin(x) = A \neq 0$ . Donc :

$$A\cos(x) + B\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} A.$$

- sinon : par équivalent classique :  $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$  et donc :

$$A\cos(x) + B\sin(x) = B\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} Bx$$

**Remarque :** si de plus  $B = 0$ , on cherche un équivalent de la fonction nulle, donc il est normal de trouver un équivalent à 0.

3. Raisonnons à nouveau par disjonction de cas :

- si  $A \neq 0$  : alors :

$$\frac{A\cos(x) + B\sin(x)}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{A}{\sqrt{x}}$$

qui tend vers  $\pm\infty$  par quotient (selon le signe de  $A$ ), et n'a donc pas de limite finie en  $0^+$  ;

- si  $A = 0$  : alors :

$$\frac{A\cos(x) + B\sin(x)}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{Bx}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} B\sqrt{x}$$

qui tend vers 0 en 0.

La condition est donc  $A = 0$ , et on a alors comme équivalent en  $0^+$  :  $B\sqrt{x}$ .

## II.2 Résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients variables

On considère dans cette question l'équation différentielle:

$$(E) : \quad x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$$

dont on cherche les solutions sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ . On note  $\mathcal{S}$  l'ensemble des solutions de  $(E)$ .

4. On a une équation différentielle linéaire homogène. L'ensemble  $\mathcal{S}$  est donc non vide car il contient la fonction nulle.

Si  $f, g \in \mathcal{S}$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , alors par linéarité la fonction  $h = \lambda f + \mu g$  est deux fois dérivable avec :

$$h' = \lambda f' + \mu g' \text{ et } h'' = \lambda f'' + \mu g''$$

et ainsi pour tout  $x \in ]0; +\infty[$  :

$$\begin{aligned} & x^2h''(x) + xh'(x) + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)h(x) \\ &= x^2(\lambda f''(x) + \mu g''(x)) + x(\lambda f'(x) + \mu g'(x)) + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)(\lambda f(x) + \mu g(x)) \\ &= \lambda \left(x^2f''(x) + xf'(x) + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)f(x)\right) + \mu \left(x^2g''(x) + xg'(x) + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)g(x)\right) \\ &= \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

donc  $h \in \mathcal{S}$ . Et ainsi  $\mathcal{S}$  est bien stable par combinaisons linéaires.

5. Soit  $y$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $]0, +\infty[$  et soit  $z$  la fonction définie par:

$$\begin{aligned} z : \quad ]0, +\infty[ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^{1/2}y(x) \end{aligned}$$

(a) Les fonctions  $y$  et  $x \mapsto \sqrt{x}$  sont de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $]0; +\infty[$ . Par produit,  $z$  est donc de classe  $\mathcal{C}^2$ .  
Et on a :

$$z' : x \mapsto \sqrt{x} \cdot y'(x) + \frac{1}{2\sqrt{x}}y(x) = \frac{2x \cdot y'(x) + y(x)}{2\sqrt{x}}.$$

et :

$$z'' : x \mapsto \sqrt{x}y''(x) + \frac{1}{2\sqrt{x}}y'(x) + \frac{1}{2\sqrt{x}}y'(x) - \frac{1}{4x\sqrt{x}}y(x) = \frac{4x^2y''(x) + 4xy'(x) - y(x)}{4x\sqrt{x}}$$

(b) On procède par double implication :

- si  $y$  est solution de  $(E)$  : alors  $4x^2yy' + 4xy' - y = -4x^2y$ . Et en réinjectant dans l'écriture de  $z''$  on déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, z''(x) = \frac{-4x^2y(x)}{4x\sqrt{x}} = -\sqrt{x}y(x) = -z(x)$$

et ainsi  $z$  est solution de l'équation  $z'' + z = 0$ .

- si  $z$  est solution de l'équation  $z'' + z = 0$  : alors pour tout  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , on a :

$$0 = z''(x) + z(x) = \frac{4x^2y''(x) + 4xy'(x) - y(x)}{4x\sqrt{x}} + \sqrt{x}y(x) = \frac{x^2y''(x) + xy'(x) + (x^2 - 1/4)y(x)}{x\sqrt{x}}$$

et ainsi :  $x^2y''(x) + xy'(x) + (x^2 - 1/4)y(x)$ .

Donc  $y$  est solution de  $(E)$ .

Ce qui prouve bien l'équivalence, avec :

$$(E') : z'' + z = 0.$$

6. On a résolu  $(E')$  en première partie. Ses solutions sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto A\cos(x) + B\sin(x), A, B \in \mathbb{R}.$$

7. On déduire que les solutions de  $(E)$  sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \frac{A\cos(x) + B\sin(x)}{\sqrt{x}}$$

dont on a vu qu'elles tendent vers une limite finie en 0 si, et seulement si,  $A = 0$ . Et ainsi :

$$\mathcal{S}_0 = \left\{ x \mapsto \frac{B\sin(x)}{\sqrt{x}} \mid B \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \lambda f_0 \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

où  $f_0 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$ .

8. Par construction, les éléments de  $\mathcal{S}_0$  sont tous prolongeables par continuité en 0, comme ils tendent tous vers une limite finie (à savoir 0 en 0).

Étudions la dérivabilité d'un tel prolongement. Considérons  $f \in \mathcal{S}_0$ . On pose  $f : x \mapsto \lambda \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$  pour  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Et on prolonge  $f$  en 0 en posant  $f(0) = 0$ . On a alors pour tout  $x > 0$  :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lambda \frac{\sin(x)}{x\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\lambda}{\sqrt{x}}$$

et on a donc deux cas :

- si  $\lambda = 0$  : alors  $f = 0$  et le prolongement est bien dérivable (de dérivée nulle) en 0 ;
- sinon : le taux d'accroissement calculé n'a pas de limite finie en 0 (il tend vers  $\pm\infty$  suivant le signe de  $\lambda$ ). Donc le prolongement n'est pas dérivable.

Et donc la fonction nulle est l'unique élément de  $\mathcal{S}_0$  dont le prolongement par continuité en 0 est dérivable.

9. Considérons  $f \in \mathcal{S}$ . Procédons par analyse-synthèse.

Si  $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{\frac{2x}{\pi}}$ , alors  $f$  a pour limite 0 en 0, donc  $f \in \mathcal{S}_0$ .

Réiproquement, soit  $f \in \mathcal{S}_0$ . Posons  $f = \lambda f_0$ . Alors :

$$f(x) = \lambda \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \lambda \sqrt{x}$$

et ainsi :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{\frac{2x}{\pi}} \Leftrightarrow \lambda \sqrt{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{\frac{2x}{\pi}} \Leftrightarrow \lambda \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \Leftrightarrow \lambda = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

Et ainsi il existe une unique fonction  $f$  solution de  $(E)$  qui vérifie cette condition, à savoir :

$$f : x \mapsto \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}.$$