

Feuille d'exercices n°3 : Rappels et compléments sur les fonctions

Exercice 1 [Exemples de fonctions]

1. $-1/x^2$;
2. $\arctan$
3. 0 (la seule)
4. constantes (les seules)
5. $\ln(|x|)$

Exercice 2 [Vrai–Faux sur les fonctions]

1. V : somme d'inégalités
2. F : $x \mapsto e^x - x$
3. F : x^2
4. F : $f : x \mapsto 1/(x+1) - 1$ si $x \geq 0$ et $1/(x-1) + 1$ si $x \leq 0$ et faire $f(x) + 1$ et $f(-x) + 1$ (ressemble à $\arctan$ sur les variations)
5. F : $f(x) = 1/x$ sur $[1; +\infty[$ et $g = \ln$;
6. V : inégalité pour un sous ensemble
7. F : $f = cste$
8. F (difficile) : $x \mapsto \cos(x) + \cos(\pi x)$ (regarder les antécédents de 2)

Exercice 3 [Partie entière et périodicité]

1. Calculer $f(x+n)$
2. $f(x) = 0 \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x \in [kn; kn+1[$ (on voit facilement que $\lfloor x \rfloor$ doit être un multiple de n) et donc :
 - si $n = 1$: la fonction est constante (nulle) donc toute période convient ;
 - si $n \geq 2$: une période est un antécédent de 0 ; elle est nécessairement entière (sinon on retranche n pour montrer qu'un nombre dans $]0; 1[$ est une période, ce qui est impossible car on peut la multiplier pour tomber dans $]1; 2[$ qui n'a pas d'antécédent de 0) ; et on voit que ce sont les $n\mathbb{Z}$.

Exercice 4 [Fonction additive bornée]

Par analyse–synthèse :

- analyse : pour une telle fonction f , on fixe $x \in \mathbb{R}$ et pose $a = f(x)$. On montre que $f(nx) = na$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (en fait $\mathbb{Z}$ mais ça suffit), qui tend vers $\pm\infty$ si $a \neq 0$. Donc $a = 0$.
- synthèse : la fonction nulle est solution (c'est facile à montrer) : c'est donc la seule.

Exercice 5 [Parité d'une fonction]

Fonction définie sur $\mathbb{R}$. On trouve qu'elle est impaire (faire apparaître la quantité conjuguée dans le $\ln$).

Exercice 6 [Existence de périodicité]

Si $a = b$: alors on a une fonction paire et impaire, donc nulle, donc toute période convient.

Sinon, on montre qu'elle est $4(a-b)$ périodique en appliquant directement la définition.

Exercice 7 [Croissance d'une fonction]

Par contraposée ou l'absurde (transformer les inégalités en appliquant $f \circ f$).

Exercice 8 [Une bijection]

On utilise que $x \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow 1 - x \in \mathbb{Q}$ pour voir que l'image et l'antécédent d'un (ir)rationnel est aussi un (ir)rationnel.

Et u est bijective d'inverse elle-même.

Exercice 9 [Choix des ensembles de départ et d'arrivée]

1. $E = [-3/2; +\infty[$, $F = [-1; +\infty[$ et $f^{-1} : y \mapsto \frac{(y+1)^2 - 3}{2}$;
2. $E = \mathbb{R}$, $F =]-1; 1[$ et $f^{-1} : y \mapsto \frac{y}{1 - |y|}$;
3. $E = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, $F = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $f^{-1} : y \mapsto 3 + \frac{4}{y-1} = \frac{3y+1}{y-1}$;
4. $E = [-1; 1]$, $F = [-1; 1]$ et $f^{-1} : y \mapsto \frac{1 - \sqrt{1-y^2}}{y}$.

Exercice 10 [Dérivée souvent nulle et monotonie]

Monotonie par dérivée.

Stricte monotonie car on peut trouver du strictement monotone sur tout intervalle d'intérieur non vide.

Exercice 11 [Variations et équations]

Faire les tableaux de variations.

1. pas de solution si $a < -1/e$, une seule (double) si $a = -1/e$, deux si $a \in]-1/e; 0[$ et une seule (simple) si $a \geq 0$
2. pareil comme $x \ln(x) = ye^y$ avec $y = \ln(x)$
3. selon la parité de n :
 - si n pair : pas de solution si $a < -n$, deux solutions (doubles) si $a = -n$, 4 solutions (simples) si $a \in]-n; 0[$, 3 solutions (une double et deux simples) si $a = 0$, et deux solutions (simples) si $a > 0$
 - si n impair : une solution (simple) si $a < -n$, deux solutions (une double une simple) si $a = -n$, trois solutions (simples) si $a \in]-n; 0[$, deux solutions (une double une simple) si $a = 0$, une solution (simple) si $a > 0$.

Exercice 12 [Asymptotes d'une fonction]

$f(x)/x$ tend vers 3, puis regarder $f(x) - 3x$ qui tend vers -3 . Donc $\Delta : y = 3x + 3$ est asymptote en $\pm\infty$.

Asymptotes verticales d'équation $x = 1$ et $x = -2$.

Exercice 13 [Calcul de dérivées]

1. définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ (quotient) de dérivée : $x \mapsto \frac{2x^2 + 2}{(1 - x^2)^2}$
2. définie dérivable sur $\mathbb{R}$ (composée) de dérivée : $x \mapsto -4xe^{-2x^2-5}$;
3. définie sur $[4/3; +\infty[$, dérivable sur $]4/3; +\infty[$ (composée), de dérivée : $x \mapsto \frac{3}{2\sqrt{3x-4}}$;
4. définie dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}\}$ (quotient), de dérivée : $x \mapsto -\frac{x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 3x + 1)^2}$
5. définie dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (quotient), de dérivée 1
En fait la fraction n'est pas irréductible : $\frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = x - 2$;
6. définie dérivable sur $]1/5; +\infty[$ (composée et combinaison linéaire), de dérivée $x \mapsto -\frac{5}{5x-1}$;
7. définie dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi/4 + k\pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (quotient), de dérivée : $x \mapsto \frac{3\cos(x)\cos(2x) + 6\sin(2x)\sin(x)}{\cos(2x)^2}$
8. définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ (composée), de dérivée : $x \mapsto \frac{\text{signe}(x^2 - 3x + 2) \cdot (2x - 3)}{2\sqrt{|x^2 - 3x + 2|}}$
et pas dérivable en 1 et 2 (tangentes verticales)
9. définie dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (composée et produit), de dérivée $x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x$;
10. définie sur $[0; 2[$, dérivable sur $]0; 2[$ (composée et quotient), de dérivée : $x \mapsto \frac{1}{(2-x)^2 \cdot \sqrt{\frac{x}{2-x}}} = \frac{1}{\sqrt{x(2-x)^3}}$;
11. définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (composée) de dérivée $x \mapsto (x(1 + \tan^2(x)) + \tan(x))e^{x \tan(x)}$;
12. définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{e\}$ (composée et quotient) de dérivée : $x \mapsto (2x(\ln(x) - 1) - \frac{1}{x}) \frac{e^{x^2}}{(\ln(x) - 1)^2}$.

Exercice 14 [Dérivées d'ordre supérieur]

1. sur $\mathbb{R}$: $x \mapsto a^n e^{ax+b}$;
2. sur $\mathbb{R}_+^*$: $x \mapsto a(a-1) \dots (a-n+2)(a-n+1)x^{a-n}$;
3. sur $\mathbb{R}$: $x \mapsto (-1)^n (x-n)e^{-x}$;
4. sur $\mathbb{R} \setminus \{-b/a\}$: $x \mapsto (-a)^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$;
5. sur $\mathbb{R}$: $x \mapsto \ln(a)^n a^x$;
6. sur $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$. On a : $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1/2}{x-1} - \frac{1/2}{x+1}$ et on se ramène au cas 4 qui donne : $x \mapsto \frac{(-1)^n n!}{2} \left(\frac{1}{(x-1)^n} - \frac{1}{(x+1)^n} \right)$

Exercice 15 [Étude complète de fonctions]

1. $x \mapsto \sqrt{x - \sqrt{x}}$: définie sur $\{0\} \cup [1; +\infty[$, dérivable sur $]1; +\infty[$ de dérivée $x \mapsto \frac{2\sqrt{x} - 1}{4\sqrt{x^2 - x}}$ (par composée), et non dérivable en 0 (pas de sens) ou en 1 (tangente verticale). Graphe ressemble beaucoup à $\sqrt{x}$ translaté de 1 à droite.
2. $x \mapsto \sqrt{1 - \sin(x)}$: définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (par composée) et non dérivable ailleurs (limites à gauche et à droite de taux d'accroissements valant $\pm\sqrt{2}/2$) ; dérivée $x \mapsto -\cos(x) \frac{1 - \sin(x)}{2\sqrt{1 - \sin(x)}}$; allure comme $|\sin|$ translatée et dilatée comme $\sqrt{1 - \sin(x)} = \sqrt{2} \left| \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right|$ (genre de courbe qui rebondit suivant le signe de $-\cos(x)$).
3. $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$: définie dérivable sur $\mathbb{R}^*$ de dérivée $x \mapsto \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} < 0$ (par concavité de $x \mapsto -x$), prolongeable par continuité en 0 (valeur 1), prolongement dérivable en 0 (nécessite d'1 de exp en 0) ; strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ avec asymptotes $y = -x$ (en $-\infty$) et $y = 0$ (en $+\infty$), au-dessus de ses asymptotes ;
4. $x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$: comme tangente symétrisée puis translatée de $\pi/2$; définie dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, de dérivée $x \mapsto -\frac{1}{\sin^2(x)}$; strictement décroissante sur chaque intervalle avec limites $\pm\infty$ à chaque bord ; π -périodique, et symétrie centrale en tous les $x = \pi/2 + k\pi$.